

# Badanie spirometryczne

Miðstöð meltingarlækninga, 3. piętrowa część budynku, Læknastöðinni Glæsibæ  
Álfheimur 74, 104 Reykjavík, [www.mml.is](http://www.mml.is)

## Informacje ogólne

Badanie spirometryczne ( ang. Urea breath test ) jest badaniem, gdzie przez wydech sprawdzana jest obecność bakterii Helicobacter Pylori w żołądku.

## Przy

<u>CZTERY TYGODNIE PRZED BADANIEM</u>	<u>Nie można</u> zażywać antybiotyków
<u>DWA TYGODNIE PRZED BADANIEM</u>	<u>Nie można</u> stosować leków leków zobojętniających kwas żołądkowy (PPI) na dwa tygodnie przed badaniem (Nexium, Omeprazol, Esomeprazol, Rabeprazol, Pariet) Jeżeli dokuczają mocne zgaga można stosować Rennie lub Gaviscon.
<u>DWIE GODZINY PRZED BADANIEM</u>	Pościć od jedzenia i picia od dwóch godzin przed badaniem.

## Przeprowadzenie badania

Przy przyjściu pacjent jest przyjęty przez pielęgniarkę. Zostanie zadane kilka pytań dotyczących przygotowania po czym omówiony jest przebieg badania.

Trzeba dmuchać w dwie torebki, połączyć jedną tabletkę pomiędzy torebkami i wypić 150ml wody. Tabletkę zawiera substancje reakcyjne, które umożliwiają wykrycie bakterii Helicobacter pylori w żołądku. Badanie zajmuje około 30 min.

Po badaniu można normalnie jeść oraz bez przeszkód zarzucać leki zobojętniające kwas żołądkowy. Skontaktujemy się z Tobą kiedy wyniki będą gotowe.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji możesz skontaktować się z naszymi pracownikami pod numerem telefonu : 535-6800 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Powodzenia,

Pozdrawiamy, pracownicy Miðstöð meltingarlækninga