

Krótká Kolonoskopia

Miðstöð meltingarlækninga, 3. hætt, bygging zachodni, Læknastöðin Glæsibæ
Álfheimum 74, 104 Reykjavík, www.mml.is

Informacje ogólne

Krótká kolonoskopia to bezpieczne badanie wykonywane przez specjalistów w dziedzinie chorób metabolicznych, które polega na zbadaniu odbytnicy i dolnej części jelita grubego.

Instrukcje dotyczące przygotowania do krótkiej kolonoskopii

Ważne jest, aby oczyścić dolną część jelita grubego przed badaniem. Należy kupić dwa opakowania środka na czyszczenie jelit **KLYX**, które dostępne są bez recepty w aptece, i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

WAŻNE! 2-5 DNI PRZED BADANIEM	Jeśli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe, takie jak Xarelto, Eliquis, Lixiana, Kóvar, Warfarin, Plavix, Grepid, Clopidogrel, Brilique, Ticlid, Effient lub Pradaxa, czasami zaleca się przerwę w ich stosowaniu, ale tylko po konsultacji z lekarzem . Wszystkie inne leki należy przyjmować jak zwykle
WIECZÓR PRZED BADANIEM	Użyj pierwszej dawki KLYX około godziny 21:00/22:00 . Lek wprowadza się do odbytnicy. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce.
TEGO SAMEGO DNIA CO BADANIE	2 godziny przed badaniem użyj drugiej dawki KLYX . Postępuj zgodnie z instrukcjami w ulotce. Nie musisz pościć przed badaniem.

Przebieg badania

Po przybyciu pielęgniarka przyjmie Cię i skieruje do pokoju, gdzie zmienisz ubranie. Podczas badania leżysz na stole na lewym boku, z nogami zgiętymi w kolanach. Będziesz mieć możliwość rozmowy ze specjalistą przed rozpoczęciem badania

Zwykle nie ma potrzeby podawania leków przed krótką kolonoskopią, ponieważ badanie trwa około 5-15 minut. Jeśli jednak chcesz sobie podania leków uspokajających, **nie będziesz mógł prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn przez co najmniej 6 godzin po badaniu**.

Specjalista wprowadzi urządzenie endoskopowe do odbytnicy i zbada dolną część jelita grubego. W trakcie badania wprowadza się powietrze, aby rozszerzyć jelito. W razie potrzeby pobierane są próbki, a także można usunąć większość polipów, które zostały wykryte. Chirurdzy przeprowadzają również leczenie po badaniu, np. terapię na hemoroidy.

Po badniu

Po badaniu ubierzesz się. Jeśli otrzymałeś leki uspokajające, odpoczniesz przez chwilę w pokoju wybudzeniowym. Specjalista omówi z Tobą wyniki badania, a następnie będziesz mógł udać się do domu. Po badaniu możesz normalnie jeść.

Jeśli pobrano próbki tkanek, skontaktujemy się z Tobą, gdy tylko wyniki będą dostępne.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym personelem pod numerem 535-6800, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 16:00.

Powodzenia,
pozdrowienia,
Personel Miðstöð meltingarlækninga

Specjaliści w chorobach układu pokarmowego

Guðmundur Ragnarsson, lekarz, PhD.
Hafsteinn Óli Guðnason, lekarz.
Halldóra Kristín Magnúsdóttir, lekarz
Kjartan B. Örvar, lekarz.
Sigurjón Vilbergsson, lekarz
Trausti Valdimarsson, lekarz, PhD.

Specjaliści w chirurgii

Anna Sverrisdóttir, lekarz.
Helgi Birgisson, lekarz, PhD.
Sigurður Blöndal, lekarz.
Steinar Ólafsson, lekarz