

Krótká Kolonoskopia i Leczenie Gumkami

Miðstöð meltingarlækninga, 3. hæð vesturhús, Læknastöðinni Glæsibæ
Álfheimum 74, 104 Reykjavík, www.mml.is

Informacje Ogólne:

Leczenie gumkami to zabieg stosowany w przypadku hemoroidów, gdy podczas wypróżniania występuje ich wypadanie i/lub krwawienie. Jest to mały zabieg wykonywany przez chirurga odbytniczo-kolonoskopo-logiczo.

Jest to niewielka procedura, którą można przeprowadzić po krótkiej kolonoskopii.

Instrukcje Dotyczące Przygotowania do Krótkiej Kolonoskopii i Leczenia Gumkami:

Ważne jest, aby oczyścić dolną część jelita grubego przed badaniem. Należy kupić dwa opakowania środka na czyszczenie jelit **KLYX**, które dostępne są bez recepty w aptece, i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

WAŻNE! 2-5 DNI PRZED BADANIEM	Jeśli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe, takie jak Xarelto, Eliquis, Lixiana, Kóvar, Warfarin, Plavix, Grepid, Clopidogrel, Brilique, Ticlid, Effient lub Pradaxa, czasami zaleca się przerwę w ich stosowaniu, ale tylko po konsultacji z lekarzem . Wszystkie inne leki należy przyjmować jak zwykle.
WIECZÓR PRZED BADANIEM	Użyj pierwszej dawki KLYX około godziny 21:00/22:00 . Lek wprowadza się do odbytnicy. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce.
W DNIU BADANIA	2 godziny przed badaniem użyj drugiej dawki KLYX . Należy postępować zgodnie z instrukcjami w ulotce. Nie musisz pościć przed badaniem.

Przebieg badania

Po przybyciu pielęgniarka przyjmie Cię i skieruje do pokoju, gdzie zmienisz ubranie. Podczas badania leżysz na stole na lewym boku, z nogami zgiętymi w kolanach. Będziesz mieć możliwość rozmowy ze specjalistą przed rozpoczęciem badania.

Zwykle nie ma potrzeby podawania leków przed krótką kolonoskopią, ponieważ badanie trwa około 5-15 minut. Jeśli jednak życzysz sobie podania leków uspokajających, **nie będziesz mógł prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn przez co najmniej 6 godzin** po badaniu.

Najpierw wykonywana jest kolonoskopowa diagnoza, która może być krótka, polegająca na zbadaniu dolnej części jelita grubego i odbytnicy, lub pełna kolonoskopowa diagnoza, aby ocenić, czy leczenie gumkami jest odpowiednie.

Na koniec stosuje się inne urządzenie, które wprowadza się do odbytnicy w celu przeprowadzenia leczenia gumkami. Małe gumki są zakładane na powiększone wewnętrzne hemoroidy za pomocą ssawki.

Po zabiegu:

Po zabiegu ubierasz się. Jeśli otrzymałeś leki uspokajające, odpoczywasz przez chwilę w pokoju wybudzeniowym. Specjalista omówi z Tobą wyniki badania, a następnie będziesz mógł udać się do domu. Po badaniu możesz jeść normalnie.

Poczujesz ciśnienie w odbytnicy i uczucie, jakbyś musiał wypróżnić się przez resztę dnia. Dlatego ważne jest, abyś dobrze oczyścił się przed badaniem, ponieważ będziesz wiedział, że to tylko uczucie związane z gumkami, a nie wypróżnianiem, które powoduje to uczucie. To uczucie zniknie następnego dnia.

Rzadko zdarza się, że leczenie gumkami powoduje krwawienie, ale jeśli tak się stanie i będzie ono obfite, ważne jest, aby udać się do lekarza lub na izbę przyjęć.

Gumki odpadają po 3-4 dniach i mieszają się z kałem. Zwykle nie zauważysz tego, ale w niektórych przypadkach może wystąpić niewielkie krwawienie

Ostateczny efekt leczenia gumkami będzie widoczny dopiero po 3-4 miesiącach.

Zaleca się, aby przez 4-5 dni po zabiegu nie uprawiać intensywnych ćwiczeń fizycznych ani nie podnosić ciężkich przedmiotów, aby gumki miały czas na działanie. Wszystkie normalne formy aktywności fizycznej są dozwolone, a dieta może być normalna.

Niektórzy pacjenci mogą mieć duże wewnętrzne hemoroidy i będą musieli przyjść na kolejne leczenie po kilku miesiącach.

WAŻNE!

Ta procedura nie jest odpowiednia w przypadku hemoroidów zewnętrznych..

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym personelem pod numerem telefonu **535-6800**, od poniedziałku do piątku w godzinach **08:00-16:00**.

Życzymy powodzenia,
Z poważaniem,
Personel Miðstöð meltingarlækninga

Specjaliści chirurgii:

Anna Sverrisdóttir, lekarz
Helgi Birgisson, lekarz, PhD.
Steinar Ólafsson, lekarz