

Gastroskopia

Miðstöð meltingarlækninga, 3. hætt, zachodnia część budynku, Klinika Læknastöðin Glæsibæ
Álfheimur 74, 104 Reykjavík, www.mml.is

Informacje ogólne

Endoskopia żołądka to badanie przeprowadzane przez specjalistów, podczas którego badany jest górny odcinek przewodu pokarmowego (dwunastnica, żołądek i przełyk). Lekarz specjalista lub lekarz rodzinny oceni, czy istnieje potrzeba wykonania endoskopii. Najczęstsze wskazania do tego badania to objawy refluksu żołądkowego, ból w klatce piersiowej oraz trudności w połykaniu.

Większość osób otrzymuje leki przed badaniem, dlatego po zabiegu nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn przez co najmniej 6 godzin.

Uwaga ! 2-5 DNI PRZED BADANIEM	Jeśli przyjmujesz leki przeciwwkrzepowe , takie jak Xarelto, Eliquis, Lixiana, Kóvar, Warfarin, Plavix, Grepid, Clopidogrel, Brilique, Ticlid, Effient lub Pradaxa, może być konieczne przerwanie ich przyjmowania, ale wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Wszystkie inne leki należy przyjmować jak zwykle.
GASTROSKOPIA PRZED POŁUDNIEM	Jeśli masz zaplanowany termin przed południem, musisz być na czczo zarówno od jedzenia, jak i picia od północy poprzedniego dnia.
GASTROSKOPIA PO POŁUDNIU	Jeśli masz zaplanowany termin po południu, możesz zjeść lekkie śniadanie. Możesz pić przezroczyste napoje: wodę, sok jabłkowy lub kawę bez mleka. Należy zaprzestać picia 2 godziny przed badaniem. Na 6 godzin przed badaniem należy być na czczo, a na 2 godziny przed badaniem zaprzestać picia jakichkolwiek napojów.

Przebieg badania

. Po przybyciu pielęgniarka przyjmie Cię i wprowadzi do pokoju badania, gdzie lekarz omówi przebieg procedury. W razie potrzeby zostanie założony wenflon, a gardło zostanie znieczulone miejscowo (opcjonalnie). Zwykle podaje się leki uspokajające lub znieczulające dożylnie. **Po podaniu tych leków nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn przez co najmniej 6 godzin.**

Podczas badania leżysz na lewym boku. Samo badanie trwa zazwyczaj krótko (5-10 minut). Lekarz wprowadza endoskop przez usta do żołądka i dwunastnicy. Jeśli to konieczne, pobierane są próbki tkanek, co jest bezbolesne.

Po gastoskopii

Pielęgniarka pomoże Ci wstać i zabierze do strefy odpoczynku, gdzie będziesz mógł odpocząć przez chwilę. Wkrótce po badaniu otrzymasz do picia sok lub wodę. Po około 30 minutach do godziny lekarz omówi wyniki badania i dalsze kroki.

Jeśli pobrano próbki, skontaktujemy się z Tobą, gdy wyniki będą dostępne.

Po powrocie do domu możesz jeść normalnie.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym personelem pod numerem telefonu 535-6800 w dni robocze od godz. 08:00 do 16:00.

Powodzenia,

Zespół Miðstöð meltingarlækninga

Specjaliści w chorobach układu pokarmowego

Guðmundur Ragnarsson, lekarz, PhD.

Hafsteinn Óli Guðnason, læknir.

Halldóra Kristín Magnúsdóttir, læknir.

Kjartan B. Örvar, lekarz.

Sigurjón Vilbergsson, lekarz.

Trausti Valdimarsson, lekarz, PhD.

Specjaliści w chirurgii

Anna Sverrisdóttir, læknir.

Helgi Birgisson, læknir, PhD.

Sigurður Blöndal, læknir.

Steinar Ólafsson, lekarz.